



الموضوع: بشأن التدخلات الوقائية للأمراض المعدية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (٢٥/٤٥٥٢٩٤٠٠) وتاريخ ١٤٤٧/١/٢٧ هـ والمشارفيه الى خطاب هيئة الصحة العامة "وقاية" رقم (١٠١-٤٧-٠٠٧٧٨١) وتاريخ ٢٠ محرم ١٤٤٧ هـ . والمشارفيه الى قيام الهيئة بدراسة التدخلات الوقائية للأمراض المعدية التالية المكورات النيسيرية السحائية وفيروس المخلوي التنفسي وفيروس الانفلونزا ونوصي بما يلي:

أولاً/ التوصيات المتعلقة بلقاح المكورات السحائية من المجموعة المصلية ب (MenB) ، توصي الهيئة بإعطاء لقاح المكورات النيسيرية السائحة من المجموعة المصلية ب (MenB) لفئات محددة معرضة لخطر الإصابة بسبب حالتهم الصحية أو بسبب حالتهم الصحية أو يسبب تزايد خطر تعرضهم للميكروب والتي تشمل الاتي:

- المرضى الذين يعانون من ضعف وظيفي في الطحال (مثل مرضى الانيميا المتجلية) أو الذين أجرى لهم استئصال الطحال.
 - المرضى الذين يعانون من نقص أو غياب مكونات الجهاز المكمل (Complement Deficiency).
 - المرضى الذين يخضعون لعلاجات مثبطة لمكونات الجهاز المكمل (Complement inhibitors) مثل ايكوليزوماب (eculizumab) أو رافوليزوماب (Ravulizumab).
 - الأطفال بعد التعافي من مرض التهاب السحايا النيسيرية وذلك بعد تقييمهم من قبل الطبيب المعالج.
 - العاملين الصحيين في المختبرات الذين يتعاملون مع عزل المكورات السحائية النيسيرية.
 - الأشخاص المعرضين للإصابة اثناء حدوث تفشي للمكورات السحائية النيسيرية المجموعة المصلية (ب).
- كما توصي الهيئة بإعطائهم ثلاث جرعات من اللقاح للفئات الموضحة أعلاه ، الجرعة الثانية بعد شهرين من الجرعة الأولى والجرعة الثالثة بعد ستة أشهر ، مع إمكانية إعطاء جرعات تنشيطية بحسب تقييم الطبيب المعالج لكل حالة.
- اسم اللقاح (4 CMenB) للفئة العمرية شهرين فأكثر (MenB-FHBP) للفئة العمرية عشرة سنوات فأكثر.
- ثانياً/ فيما يخص التوصيات المتعلقة بلقاحات الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) للبالغين الأكبر سناً:
- توصي الهيئة بتطعيم الأشخاص في الفئة العمرية ٦٠ عام وأكبر ولديهم احدى عوامل الخطورة الموضحة أدناه بلقاح الفيروس التنفسي المخلوي بجرعة واحدة اذا لم يتلقوا اللقاح من قبل وذلك للفئات التالية:
- امراض القلب المزمنة (مثل فشل القلب).
 - امراض الكلى المزمنة.
 - مرض السكري.
 - امراض الكبد المزمنة (مثل تلف الكبد).
 - سكان مرافق الرعاية طويلة الاجل.
 - امراض الرئة او جهاز التنفسي المزمنة (مثل الانسداد الرئوي المزمن والربو).

- حالات ضعف المناعة المتوسطة الى الشديدة.
- امراض الدم المزمنة (مثل الانيميا المنجلية والثلاسيميا).
- السمّة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم ٤٠ كجم/م^٢).
- جميع البالغين بعمر ٧٥ سنة وأكبر.
- الامراض العصبية المزمنة أو الاضطرابات العصبية العضلية التي تأثر على مجرى التنفس أو عضلات الجهاز التنفسي.

كما توصي الهيئة بتطعيم الأشخاص في الفئة العمرية ٥٠ الى ٥٩ سنة ، ولم يتلقوا اللقاح من قبل ولديهم احدى عوامل الخطورة المشار اليها أعلاه بناءً على التقييم وتوصية الطبيب المعالج.

ثالثاً/ التوصيات المتعلقة بلقاح الانفلونزا الثلاثي ومقارنته بلقاح الانفلونزا الرباعي:

توصي الهيئة بأفضلية استخدام لقاح الانفلونزا الثلاثي بدل من لقاح الانفلونزا الرباعي ، وذلك نظراً لعدم رصد سلالة (Yamgata) عالمياً أو محلياً ولعدم ارتباطها بتفشيات مؤكدة لفيروس الانفلونزا ، وكما توصي بأفضلية استخدام لقاح الانفلونزا الثلاثي عالي الجرعات للأشخاص في الفئة العمرية ٦٥ سنة وأكبر بدل من لقاح الانفلونزا عالي الجرعات الرباعي ، مع أهمية استمرار تقييمها سنوياً نظراً للطبيعة المتغيرة لسلالات الانفلونزا واستناداً الى مستجدات بيانات الترصد الوبائي المحلي والعالمي.

عليه نأمل من سعادتكم التكرم بالاطلاع ، والالتزام بالتوصيات المذكورة أعلاه.

وتفضلوا بقبول أطيّب تحياتي واحترامي..

رقم القيد (٢٥-٢٠٢٧-٥)

الأمين العام المكلف

عتيق بن علي الشفيعي